

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата
«Активитон раствор для инъекций»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Активитон раствор для инъекций (Solutio Activitoni pro injectionibus).

Международное непатентованное наименование: бутафосфан, карнитин, никотинамид, токоферола ацетат, пиридоксин, декспантенол, фолиевая кислота, цианокобаламин.

Лекарственная форма: раствор для внутримышечного и подкожного введения, и приема внутрь.

1.2 Препарат представляет собой прозрачную жидкость красно-оранжевого цвета со специфическим запахом.

В 1,0 мл препарата содержится 100 мг бутафосфана, 40 мг L-карнитина, 40 мг никотинамида, 30 мг α -токоферола ацетата; 10 мг пиридоксина гидрохлорида, 10 мг декспантенола (Д-пантенол), 5 мг фолиевой кислоты, 0,12 мг цианокобаламина, вспомогательные вещества (солютол HS 15, триэтаноламин, железо (III) хлорид 6-водный, спирт бензиловый, вода для инъекций).

1.3 Активитон раствор для инъекций выпускают во флаконах темного стекла по 10 и 100 мл.

1.4 Препарат хранят и транспортируют в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 25 °С.

Срок годности – 2 (два) года от даты производства при соблюдении условий хранения и транспортирования. Срок годности после первого вскрытия флакона – 28 суток при условии хранения при температуре от 15 °С до 25 °С.

Запрещается применять препарат по истечении срока годности.

Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

1.6 Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.7 Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Активитон раствор для инъекций - витаминный комплекс, стимулятор обмена веществ и тонизирующее средство.

2.2 Бутафосфан, входящий в состав препарата, - органическое соединение фосфора, оказывающее влияние на многие ассимиляционные процессы в организме: деятельность ЦНС, обмен веществ, в частности жиров и белков, процессы, протекающие в мембранах внутриклеточных систем и мышцах (в том числе сердечной).

Бутафосфан улучшает утилизацию глюкозы в крови, что способствует стимуляции энергетического обмена; ускоряет процессы метаболизма за счет стимуляции АДФ-АТФ цикла; активизирует все функции печени; повышает неспецифическую резистентность организма; стимулирует гладкую мускулатуру и повышает ее двигательную активность; восстанавливает утомленную сердечную мышцу; стимулирует образование костной ткани; нормализует уровень кортизола в крови; стимулирует синтез протеина, ускоряя рост и развитие животного, а также репаративные свойства органов и тканей.

2.3 Карнитин - природное вещество, родственное витаминам группы В. Является кофактором метаболических процессов, обеспечивающих поддержание активности коэнзима А. Снижает основной обмен, замедляет распад белковых и углеводных молекул. Способствует проникновению через мембраны митохондрий и расщеплению длинноцепочных жирных кислот с образованием ацетил-КоА (необходим для обеспечения

активности пируваткарбоксилазы в процессе глюконеогенеза, образования кетоновых тел, синтеза холина и его эфиров, окислительного фосфорилирования и образования АТФ).

2.4 Никотинамид (витамин РР) стимулирует синтез никотинадениндинуклеотида (НАД) и никотинадениндинуклеотидфосфата (НАДФ). В виде НАД и НАДФ участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях, обеспечивая нормальный ход многих видов обмена, в т.ч. энергетического.

2.5 Токоферола ацетат (витамин Е) является активным антиоксидантом, тормозит перекисное окисление липидов, усиливающееся при многих заболеваниях, предупреждает повреждение клеточных структур свободными радикалами. Принимает участие в процессах тканевого дыхания, биосинтезе гема и белков, обмене жиров и углеводов, пролиферации клеток и других метаболических процессах.

2.6 Пиридоксин (витамин В₆) фосфорилируется и в виде пиридоксальфосфата, входит в состав ферментов, катализирующих декарбоксилирование и переаминирование. Играет важную роль в метаболизме триптофана, глутаминовой кислоты, цистеина, метионина, а также в транспорте аминокислот через клеточную мембрану. Необходим для активации фосфоорилазы, для образования нейромедиаторов, гамма-аминомасляной кислоты, глицина, серотонина. Участвует в обмене витамина В₁₂, фолиевой кислоты, в синтезе порфиринов, в обмене ненасыщенных жирных кислот.

2.7 Декспантенол относится к витаминам группы В, является производным пантотеновой кислоты. Играет важную роль в процессах ацетилирования и окисления, участвует в углеводном и жировом обмене, в синтезе ацетилхолина, кортикостероидов, порфиринов. Оказывает выраженное влияние на образование и функцию эпителиальной ткани, обладает некоторой противовоспалительной активностью.

2.8 Фолиевая кислота (витамин В₉) в организме восстанавливается до тетрагидрофолиевой кислоты, являющейся коферментом, участвующим в различных метаболических процессах. Необходима для нормального созревания мегалобластов и образования нормобластов. Стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот (в т.ч. метионина, серина), нуклеиновых кислот, пуринов и пиримидинов, в обмене холина.

2.9 Цианокобаламин (витамин В₁₂) относится к группе водорастворимых витаминов. Обладает высокой биологической активностью. Необходим для нормального кроветворения (способствует созреванию эритроцитов). Участвует в процессах трансметилирования, переносе водорода, образовании метионина, нуклеиновых кислот, холина, креатина. Способствует накоплению в эритроцитах соединений, содержащих сульфгидрильные группы. Оказывает благоприятное влияние на функцию печени и нервной системы. Активирует свертывающую систему крови, в высоких дозах вызывает повышение активности тромбопластина и протромбина.

2.10 Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76).

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Активитон раствор для инъекций применяют животным в качестве тонизирующего средства при родах и с целью профилактики послеродовых осложнений (тетания, послеродовой парез); как тонизирующее средство при перенапряжении и повышенной активности у лошадей за 2-3 дня до соревнований; молодняку для повышения сопротивляемости организма к различным заболеваниям; как дополнительное средство при заболеваниях, обусловленных недостаточностью в организме кальция и магния; для повышения мышечной активности.

3.2 Активитон раствор для инъекций вводят животным внутримышечно или подкожно один раз в сутки в течение 4-5 дней. Разовые дозы препарата при острых заболеваниях составляют:

- лошадям, крупному рогатому скоту – 10 - 25 мл / животное или 0,02 – 0,05 мл / кг массы тела, но не более 25 мл;
- телятам, жеребят – 5 - 12 мл / животное или 0,1 – 0,25 мл / кг массы тела, но не более 12 мл;
- овцам, козам – 2,5 - 8 мл или 0,05 – 0,15 мл / кг массы тела, но не более 8 мл;
- ягнятам, козлятам – 1,5-2,5 мл / животное или 0,15 – 0,25 мл / кг массы тела, но не более 2,5 мл;

- свиньям – 2,5-10 мл / животное или 0,025 – 0,05 мл / кг массы тела, но не более 8 мл;
- поросятам-сосунам – 1-2,5 мл / животное;
- собакам – 0,5 – 5 мл / животное или 0,05 – 0,5 мл / кг массы тела, но не более 5 мл;
- кошкам – 0,25-0,5 мл / животное или 0,05 – 0,1 мл / кг массы тела, но не более 0,5 мл.

Возможно также применение препарата внутрь с водой в следующих дозах: собакам – 1-10 мл / животное, кошкам – 1-5 мл / животное, курам-несушкам и бройлерам – 2-3 мл / л, цыплятам и ремонтному молодняку 1,0-1,5 мл / л.

При хронических заболеваниях лекарственный препарат применяют в половине от указанных выше доз. В случае необходимости проводят повторный курс с интервалом 5-14 дней.

Температура вводимого раствора для инъекций должна быть близкой к температуре тела животного.

3.3 Препарат противопоказан при достаточном или избыточном содержании в рационе животных биологически активных веществ, входящих в состав препарата, а также при повышенной индивидуальной чувствительности к его компонентам.

Противопоказанием является также индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. У гиперчувствительных животных возможны аллергические реакции. При применении препарата в соответствии с инструкцией побочные явления, как правило, не наблюдаются.

3.4 Продукцию от животных и птицы после применения препарата можно использовать в пищевых целях без ограничений.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

4.2 Упаковку из-под препарата запрещено использовать для бытовых целей.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Иностранное производственное унитарное предприятие «ВИК – здоровье животных», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, д. 29.

Адрес производственной площадки: Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, д. 25.

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения ветеринарного лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «ВИК – здоровье животных», Россия, 140125, Московская обл., г.о. Люберцы, д. Островцы, кв-л 30137, стр. 681/2, офис 30, тел.: +7 (495) 777- 67- 67, e-mail: info@vicgroup.ru.

Инструкция подготовлена сотрудниками кафедры фармакологии и токсикологии (И.А. Ятусевич) УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» и иностранного унитарного предприятия «ВИК – здоровье животных» (О.Г. Устинова) на основании документов, предоставленных ООО «ВИК – здоровье животных» (Россия).